

เช็กกันหน่อย วัคซีนเด็กที่ควรฉีดตามช่วงอายุ มีอะไรบ้างนะ



ศูนย์ : ศูนย์สุขภาพเด็ก

บทความโดยแพทย์ : นพ. ศราวุธ ตั้งมานะกุล

การฉีดวัคซีนจะช่วยกระตุ้นร่างกายให้สร้างภูมิคุ้มกันต่อโรค เมื่อเด็กๆ ได้รับวัคซีนแล้วจะทำให้โอกาสป่วยเป็นโรคติดต่อต่างๆ ลดลงอย่างมาก เด็กจำเป็นต้องได้รับวัคซีนทุกคนตั้งแต่แรกเกิด ฉะนั้นไม่ควรละเลยเรื่องการฉีดวัคซีน โดยวัคซีนที่ต้องฉีดนั้นจะมีทั้งวัคซีนพื้นฐานและวัคซีนเสริม ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่มาเช็กดูกันว่าลูกน้อยของคุณฉีดวัคซีนกันหรือยัง ถ้ายังสามารถเข้ารับคำปรึกษากับกุมารแพทย์ได้ว่าจะต้องฉีดกี่เข็ม ฉีดห่างกันกี่เดือน พร้อมรับวัคซีนตามเกณฑ์อายุที่กำหนดกันได้เลย

อายุ

ชนิดวัคซีน

เด็กแรกเกิด

- วัคซีนโรคตับอักเสบบี (HB1) ควรฉีดให้เร็วที่สุด ภายใน 24 ชั่วโมงหลังคลอด
- วัคซีนป้องกันวัณโรค (BCG) ฉีดให้เด็กก่อนออกจากโรงพยาบาล

1 เดือน

- วัคซีนโรคตับอักเสบบี (HB2) โดยเฉพาะรายที่มารดาเป็นพาหะไวรัสตับอักเสบบี

2 เดือน

- วัคซีนรวมป้องกันคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับอักเสบบี-ฮิบ (DTP-HB-Hib1) ครั้งที่ 1
- วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน (OPV1) ครั้งที่ 1
- วัคซีนเสริมโรคตา ป้องกันอุจจาระร่วง (Rota1) ครั้งที่ 1
- วัคซีนเสริมป้องกันโรคปอดบวม IPD ครั้งที่ 1

หมายเหตุ : ห้ามให้วัคซีนโรคตาครั้งที่ 1 ในเด็กอายุมากกว่า 15 สัปดาห์

4 เดือน

- วัคซีนรวมป้องกันคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับอักเสบบี-ฮิบ (DTP-HB-Hib2) ครั้งที่ 2
- วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน (OPV2) ครั้งที่ 2
- วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด (IPV)
- วัคซีนเสริมโรคตา ป้องกันอุจจาระร่วง (Rota2) ครั้งที่ 2
- วัคซีนเสริมป้องกันโรคปอดบวม IPD ครั้งที่ 2

หมายเหตุ :

- ให้วัคซีนโปลิโอชนิดฉีด 1 เข็ม พร้อมกับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน 1 ครั้ง
- ห้ามให้วัคซีนโรคตาครั้งสุดท้าย ในอายุมากกว่า 32 สัปดาห์

6 เดือน

- วัคซีนรวมป้องกันคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับอักเสบบี-ฮิบ (DTP-HB-Hib3) ครั้งที่ 3
- วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน (OPV3) ครั้งที่ 3
- วัคซีนเสริมโรคตา ป้องกันอุจจาระร่วง (Rota3) ครั้งที่ 3
- วัคซีนเสริมป้องกันโรคไขหวัดใหญ่ ครั้งที่ 1

อายุ

ชนิดวัคซีน

- วัคซีนเสริมป้องกันโรคปอดบวม IPD ครั้งที่ 3

หมายเหตุ :

- ห้ามให้วัคซีนโรคตาครั้งสุดท้าย ในอายุมากกว่า 32 สัปดาห์
- วัคซีนไขหวัดใหญ่ ถ้าอายุน้อยกว่า 9 ปี ฉีดครั้งแรกต้องฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 1 เดือน หลังจากนั้นฉีดปีละครั้ง

- วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน-คางทูม (MMR1) ครั้งที่ 1

9 เดือน

หมายเหตุ : หากไม่ได้ฉีดเมื่ออายุ 9 เดือน ให้รีบตามฉีดโดยเร็วที่สุด

- วัคซีนป้องกันไขสมองอักเสบเจอี (JE1) ครั้งที่ 1
- วัคซีนเสริมป้องกันโรคปอดบวม IPD กระตุ้นครั้งสุดท้าย
- วัคซีนเสริมป้องกันโรคอีสุกอีใส (VZV1) ครั้งที่ 1
- วัคซีนตับอักเสบบี (HAV1) ครั้งที่ 1

12-15 เดือน

- วัคซีนรวมป้องกันคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน (DTP4) ครั้งที่ 4
- วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน (OPV4) ครั้งที่ 4

1 ปีครึ่ง

- วัคซีนป้องกันไขสมองอักเสบเจอี (JE2) ครั้งที่ 2
- วัคซีนตับอักเสบบี (HAV2) ครั้งที่ 2

1 ปีครึ่ง - 2 ปี

- วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-หัดเยอรมัน-คางทูม (MMR2) ครั้งที่ 2
- วัคซีนเสริมป้องกันโรคอีสุกอีใส (VZV2) ครั้งที่ 2

2 ปีครึ่ง

อายุ

ชนิดวัคซีน

อายุ 4-6 ปี

- วัคซีนรวมป้องกันคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน (DTP5) ครั้งที่ 5
- วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน (OPV5) ครั้งที่ 5

11 ปี (ป.5)

- วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกจากเชื้อเอชพีวี (HPV) จำนวน 2 เข็ม

หมายเหตุ : ระยะห่างระหว่างเข็ม ห่างกันอย่างน้อย 6-12 เดือน

12 ปี (ป.6)

- วัคซีนรวมคอตีบ-บาดทะยัก (Td)

สำหรับวัคซีนเสริมอื่นๆ ได้แก่

อายุ

ชนิดวัคซีน

6 เดือน - 5 ปี

- วัคซีนมือเท้าปาก จากเชื้อไวรัสเอนเทอโรไวรัส 71 (อีวี 71) จำนวนฉีด 2 เข็ม โดยฉีดระยะห่างกัน 1 เดือน

อายุ 9
ปีขึ้นไป

- วัคซีนไขเลือดออก (DEN) จำนวน 2 หรือ 3 เข็ม ขึ้นอยู่กับชนิดวัคซีน โดยฉีดระยะห่างกัน 6 เดือน

ทุกช่วงอายุ

- วัคซีนพิษสุนัขบ้าก่อนสัมผัสสัตว์โรค ฉีดจำนวน 2 เข็ม ห่างกันอย่างน้อย 7 วัน (วันที่ 0,7)

วัคซีนดังกล่าวข้างต้นนี้จะทำหน้าที่ป้องกันและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคต่างๆ

ให้กับลูกน้อยของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถพาลูกน้อยของคุณไปรับวัคซีนตามกำหนดเพื่อสุขภาพที่ดีในระยะยาว

นพ.ศราวุธ ตั้งมานะกุล

กุมารเวชศาสตร์ / กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

ศูนย์สุขภาพเด็ก

นัดหมายแพทย์

ปรึกษาทุกปัญหาสุขภาพแบบออนไลน์
ไม่เสียค่าใช้จ่าย